

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТИ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ХИРУРГИЧНИ МАНИПУЛАЦИИ

ПРЕДИ МАНИПУЛАЦИЯТА:

1. Ако Ви е предписано медикаментозно лечение от Вашия стоматолог – започнете приема на медикаментите съгласно дадените Ви указания. Уведомете Вашия стоматолог ако приемате други медикаменти, изписани Ви преди хирургичната манипулация и ако имате придружаващи **заболявания** и/или **алергии**. Може да Ви бъде указано да спрете временно приема на някои медикаменти (например АСПИРИН) и/или да Ви бъдат назначени допълнителни медикаменти и изследвания.
2. Ако са Ви назначени изследвания или рентгенови снимки – носете ги с Вас!
3. НЕ трябва да идвате в кабинета без да сте се нахранили, защото след манипулацията ще трябва да не се храните няколко часа.
4. Желателно е да сте отпочинали преди хирургичната интервенция, дамите да бъдат без грим , а господата – избръснати.

СЛЕД МАНИПУЛАЦИЯТА:

1. Стискайте марления тампон 20 мин., след което го извадете от устата и го изхвърлете.
2. Ако след махане на марлята има остатъчно кървене поставете върху раната чиста марля и притиснете отново за 20 мин. Ако кървенето продължи, моля обърнете се към Вашия стоматолог.
3. Поне 2 часа не яжте, не пийте течности и не пушете.
4. Няколко часа след операцията поставете лед (в найлонова торбичка) върху лицето в областта на интервенцията. Това ще намали отока и ще намали вероятността от повторен кръвоизлив от раната.
5. След преминаване действието на упойката е възможно да има болка в областта на раната. Може да вземате обезболяващ медикамент, но той НЕ трябва да съдържа Aspirin.
6. Ако Ви е предписано медикаментозно лечение-стриктно спазвайте часовете за прием на медикаментите. Уведомете Вашия стоматолог ако приемате други медикаменти изписани Ви преди хирургичната манипулация. Спазвайте назначените Ви контролни прегледи.
7. Няколко дни избягвайте горещи храни и напитки. Не дъвчете в областта на раната.
8. При миене на зъбите не докосвайте раната с четката за зъби . Няколко дни НЕ изплаквайте с води за уста , отвари и т.н.. Не докосвайте раната с пръсти или други предмети.
9. Няколко дни е възможно да има лека болка, подуване в областта на операцията, и затруднено отваряне на устата. Ако тези симптоми се задържат по-продължително или се засилват, моля обърнете се към Вашия стоматолог.
10. Ако са ви поставени конци, те трябва да бъдат свалени след около 1 седмица.
11. Ако имате някакви въпроси относно хода на лечението, моля обърнете се към Вашия стоматолог.